

# Kirschlorbeer

*Prunus laurocerasus*



## Herkunft

Südwestasien

## Pflanze

Immergrüner Strauch oder bis 6 m hoher Baum<sup>11</sup>

## Blätter

Hartlederig, verkehrt-eilanzettlich, kurz zugespitzt, 10 bis 15 cm lang, oberseits glänzend, dunkelgrün, ganzrandig oder schwach gesägt, Rand nach unten gebogen<sup>8,11</sup>

## Blüten

Blütezeit: April bis Mai<sup>11</sup>

Blütenstand: eine 10 bis 15 cm lange, vielblütige, aufrechte Traube mit blattlosem Stiel, Blüten weiss<sup>1</sup>

## Frucht

Glänzend schwarz, kugelig<sup>8</sup>



Beeren werden oft von Vögeln gefressen, sollten entfernt und im Kehrrecht entsorgt werden.



Blütenstände sind weisse, aufrechte Trauben.



### **Standort**

Wärmeliebende Laubwälder, Gebüsche<sup>8</sup>.

### **Ausbreitung**

Durch Samen und Vögel

### **Bekämpfung**

Ausstocken. Nachkontrolle auf Wurzelausschläge und Keimlinge. Bei grösseren Exemplaren chemische Bekämpfung (Fachbewilligungspflicht, nur wo erlaubt) mit systemischem Herbizid direkt auf Schnittstelle.