

Schmalblättriges Greiskraut



Senecio inaequidens



Herkunft

Südafrika

Pflanze

Mehrjährig⁹, 40 bis 60 cm hoch⁸, vom Grund an verzweigt¹¹, Pflanze kahl, grasgrün¹¹

Blätter

Schmal lineal (6 bis 7 cm lang¹¹, 1 bis 5 mm breit)⁸, ungeteilt, fast ganzrandig, mit einzelnen, entfernt stehenden Zähnen⁸, "ledrig" beim Anfassen, mit kurzen Öhrchen umfassend¹¹

Stängel

Ästig, vielköpfig und am Grund oft etwas verholzt⁸

Blüte

Blütezeit: August bis Oktober¹¹

Blütenköpfchen 1.5 bis 2.5 cm¹¹, endständig
Köpfchen nickend vor dem Aufblühen.



Standort

Trockenwarme Wegränder, Schuttplätze⁷/trockene Ruderalstandorte/Buntbrachen/offene Verkehrsflächen wie Strassenränder- und Böschungen/Bahnareale und Ödland¹¹

Ausbreitung

Mit Samen durch den Wind und Fahrzeuge (Samen haften im Reifenprofil, Radkasten und am Fahrzeug). Eine einzelne Pflanze produziert bis zu 30'000 Samen⁹. Samen reifen noch zwei bis drei Tage weiter, nachdem die Mutterpflanze ausgerissen wurde⁹. Stängel, die den Boden berühren, können an dieser Stelle neu bewurzeln (vegetative Vermehrung)⁹.

Bekämpfung

Pflanzen mind. 3x jährlich ausreissen. Blüht bis in den Dezember und darüber hinaus (je nach Lage/Witterung). Zum Transport geschlossene Säcke verwenden (z.B. mit Kabelbinder verschliessen).

Melde- und Bekämpfungsaufforderung

Für Vorkommen gilt eine Bekämpfungsaufforderung. Bitte melden Sie Vorkommen der Neobiota-Ansprechperson der Gemeinde.

Verwechslungsmöglichkeiten

Mit anderen giftigen, aber einheimischen Kreuzkräutern.



Wasser-Greiskraut
Senecio aquaticus



Jakobs-Greiskraut
Senecio jacobaea



Raukenblättriges Greiskraut
Senecio erucifolius



Gemeines Leinkraut *Linaria vulgaris*



Gemeines Leinkraut
Linaria vulgaris
Im nicht-blühenden Zustand mit dem einheimischen Gemeinen Leinkraut. Die Blätter vom Leinkraut sind aber viel feiner und weniger ledrig beim Anfassen und nicht gezähnt.